

VIRUNAL EMBKC

смесевое четвертичное аммониевое соединение

Описание

Вирунал EMBKC представляет собой субстанцию, которая содержит 80 % активного вещества (алкилдиметилбензил аммония хлорид 40 % и алкилдиметилэтилбензиламмония хлорид 40 %), этиловый спирт 10 % и 10 % воды. Вирунал EMBKC можно применять как активную добавку для использования в составах дезинфицирующих средств, так и как готовый продукт. VIRUNAL EMBKC обладает антимикробной активностью в отношении различных грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, вирусов, грибов рода Кандида и Триходитон, может выполнять роль бактерицида, фунгицида и альгицида. Вирунал EMBKC несовместим с сильными окислителями и анионными соединениями.

Внешний вид

Вирунал EMBKC представляет собой от бесцветного до бледно-желтого оттенка жидкость.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Физическое состояние при 20 °С	жидкость
Содержание активного вещества, %	80
Содержание воды, %	10
Содержание этилового спирта, %	10
Вязкость при 25 °С, CPS	25
Ph при 25 °С	6-9
Удельный вес, г/мл	0,95±0,02

Упаковка

Вирунал EMBKC поставляется в надежной и удобной в использовании промышленной упаковке:

Наименование	Объем, л	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Размер упаковки, см	Количество на паллете, шт.	Размер паллетоместа, см
Бочка полиэтиленовая	210,5	200	213,60	90x60x60	4	115x115



Телефон/факс: +7 (495) 788-26-36
E-mail: info@chemsystem.ru
www.chemsystem.ru

VIRUNAL EMBKC

смесевое четвертичное аммониевое соединение

Условия транспортировки и хранения

Вирунал EMBKC рекомендуется хранить:

- в прохладном, хорошо проветриваемом месте;
- в удаленности от источников тепла и возгорания (искр, огня и т. д.);
- в помещении не курить.

В случае невозможности хранения в заводской упаковке, допускается хранение в герметичной упаковке, изготовленной из полиэтилена высокой плотности или стекла. Для сохранения цвета и во избежание разложения продукта, Вирунал EMBKC не следует хранить при высоких температурах. Хранение при температуре ниже температуры плавления приведет к разделению или отвердеванию продукта. В таких случаях весь объем продукта следует подогреть до 20-50 °С и гомогенизировать прежде, чем использовать.

Вирунал EMBKC транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта при перевозке коррозионных и легковоспламеняющихся жидкостей.

При соблюдении условий транспортировки и хранения в не вскрытой и герметичной заводской упаковке, гарантийный срок хранения составляет 36 месяцев с даты изготовления.

Области применения

Вирунал EMBKC применяется:

- для производства биоцидов;
- в качестве альгицида в плавательных бассейнах;
- в качестве дезинфицирующего средства.